

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

ВАЛЬДОКСАН (агомелатин) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг

В этой памятке описано, для чего применяется агомелатин, как снизить риск побочных эффектов со стороны печени и что делать, если они появились во время лечения. За более подробной информацией обратитесь к Вашему врачу.

Не забудьте взять с собой эту памятку при посещении врача.

Вальдоксан (агомелатин) – это антидепрессант, который применяется для лечения депрессии и генерализованного тревожного расстройства. Соблюдайте рекомендации врача по приему агомелатина (доза, длительность приема, визиты к врачу, анализы крови).

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции (побочные эффекты), проконсультируйтесь с лечащим врачом. Это могут быть нежелательные реакции, как указанные, так и не указанные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях по указанным ниже адресам:

В России

- <http://roszdravnadzor.gov.ru> (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения)
- АО «Сервье»: 125196, г. Москва, ул. Лесная, дом 7, этаж 7/8/9, тел.: +7 (495) 937 07 00
Эл. почта: servier.russia@servier.com, форма обратной связи на интернет-сайте www.servier.ru

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше информации по безопасности препарата.

Перед началом приема агомелатина

Проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях, потому что препарат может быть противопоказан в некоторых ситуациях:

- у Вас когда-либо были проблемы с печенью,
- у Вас есть избыточный вес,
- Вы болеете сахарным диабетом,
- Вы употребляете алкогольные напитки в избыточном количестве,
- Вы принимаете другие препараты (особенно оказывающие влияние на печень).

Во время лечения агомелатином

Важно не прерывать резко лечение агомелатином, в этом случае плохое настроение, депрессия или тревога могут вернуться. Проконсультируйтесь с врачом, как безопасно прекратить прием в случае необходимости.

Рекомендации для контроля развития нежелательных реакций со стороны печени

В редких случаях агомелатин вызывает нежелательные реакции, в том числе нарушение работы печени. Регулярно сдавайте анализы крови для контроля уровня печеночных ферментов в соответствии с графиком, установленным Вашим врачом.

ЗАЧЕМ?

Анализ крови перед началом лечения позволит врачу оценить работу печени, и можно ли Вам принимать агомелатин.

Во время лечения агомелатином у некоторых пациентов может повышаться уровень печеночных ферментов в крови. Необходимо, чтобы во время лечения врач мог отслеживать их уровень, поскольку их повышение может свидетельствовать о проблемах с печенью.

КОГДА?

Анализ крови следует сдавать:

- перед началом лечения,
- через 3 недели после начала лечения,
- приблизительно через 6 недель после начала лечения,
- приблизительно через 3 месяца после начала лечения,
- приблизительно через 6 месяцев после начала лечения.

Если во время лечения у Вас повысится уровень печеночных ферментов в крови, немедленно сообщите об этом Вашему врачу.

Внимательно следите за возможным появлением признаков нарушения работы печени, таких как:

- желтушный оттенок кожи или глаз;
- нетипично темная моча;
- светлая окраска стула;
- боль в правой верхней половине живота;
- необычная утомляемость (чаще всего в комбинации в вышеописанными симптомами).

При появлении этих признаков немедленно обратитесь к врачу для решения вопроса о дальнейшем приеме агомелатина.

ВСЕГДА СООБЩАЙТЕ ВРАЧУ, ЕСЛИ ВАС ЧТО-ТО БЕСПОКОИТ

Обратитесь к врачу или поговорите с близкими, если Вас беспокоит что-то, связанное с Вашим заболеванием или лечением.

Назначения анализов крови

При приеме агомелатина важно регулярно проводить анализы крови.

Таблица поможет Вам соблюдать график проведения анализов. Обсудите с врачом, если Вам сложно его соблюдать. Вы можете использовать другой удобный для Вас способ отслеживания графика.

	Дата (начало лечения – 25 мг)	Дата (в случае увеличения дозы – 50 мг)
Агомелатин		
Анализ для определения уровня печеночных ферментов		
1-й анализ (до начала лечения)		
2-й анализ (3 недели после начала лечения)		
3-й анализ (~ 6 недели после начала лечения)		
4-й анализ (~ 3 месяца после начала лечения)		
5-й анализ (~ 6 месяцев после начала лечения)		

Если врач примет решение увеличить дозу агомелатина до 50 мг в сутки, то необходимо будет проводить анализы с той же частотой, что и в начале лечения.

Ваш врач обсудит с Вами необходимость проведения дополнительных анализов.

Более подробная информация о лекарственном препарате Вальдоксан(агомелатин) приведена в листке-вкладыше. Внимательно прочитайте его перед началом приема препарата.